



Praktsporrspindel



Klass: Arachnida (spindeldjur), **Ordning:** Araneae (spindlar), **Familj:** Eutichuridae (sporrspindlar), **Släkte:** *Cheiracanthium*, **Art:** *Cheiracanthium elegans* - praktsporrspindel Thorell, 1875 **Synonymer:**

Kännetecken

Den är en ganska stor och vackert grön säckspindel. Till skillnad mot den betydligt vanligare gröna bladspindeln, *Micrommata virescens*, som kan uppträda i samma miljöer, hålls inte benen utåt, utan på ett för spindlar mer normalt sätt. Bra avbildningar av kopulationsorganen finns i Heimer & Nentwig.

Utbredning och status

Arten är funnen på två bergknallar, Stenshuvud och Kullaberg, och från en sandhed utanför Torna Hällestad. Alla lokalerna ligger i Skåne. Förutom fynd från Kolahalvön är dessa lokaler de nordligast kända för arten. Närmast känd från Polen och Tyskland och i övrigt sporadiskt funnen i Syd- och Mellaneuropa, österut till Centralasien.

Ekologi

Arten är tydligen beroende av varmt och soligt mikroklimat med örter, gräs och omgivande buskar eller små träd. Den är påträffad på Kullaberg och Stenshuvud i sydbranter. Fyndet från Torna Hällestad är från en sandhed med omgivande buskar och träd.

Hot

Då arten finns på två naturskyddade områden är hotet inte akut. Även den tredje lokalen är känd för sina naturvärden och kommer nog att få ett visst skydd. På sikt kan igenväxning på Kullaberg eller Stenshuvud hota populationerna där.

Åtgärder

Ekkratt och buskar med omväxlande öppna partier måste behållas.

Litteratur

Heimer, S & Nentwig, M. 1991. *Spinnen Mitteleuropas*. Paul Parey, Hamburg & Berlin. Jonsson, L. J. 1995. taggspindeln *Cheiracanthium elegans*, ny för Nordeuropa, med en kort översikt över släktets svenska arter. *Entomologisk Tidskrift* 116: 55–59.

Författare

Lars J. Jonsson 1997, Rev. Lars J. Jonsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2007.