



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Leiodidae (mycelbaggar), **Släkte:** *Dreposcia*, **Art:** *Dreposcia umbrina* (Erichson, 1837) **Synonymer:**

Kännetecken

En 3,5 till 4,5 mm lång, brun skalbagge med ganska kraftiga ben och sidenglänsande behåring.

Utbredning och status

Påträffad i några landskap från Skåne till Västmanland. Aktuella fynd i östra Småland, Öland, Östergötland och Mälardalslandskapen. Närmast i Danmark, där endast ett 1800-talsfynd är känt, samt i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i anslutning till fågelbon och smärre kadaver i gamla ihåliga ädellövträd med bon av i första hand fåglar, men även andra djur. De flesta fynden är gjorda i anslutning till gamla, fritt stående hålekar, men arten är även funnen i ihåliga lindar och almar. Den fullbildade skalbaggen kan påträffas under en stor del av året vid sållning inuti stamhåligheterna.

Hot

Arten är främst påträffad i områden med en hög frekvens av hålträd. Den tycks ställa höga krav på sin miljö och förekommer ofta enbart i ett eller ett fåtal träd, trots att det kan finnas gott om till synes passande sådana i omgivningen. Genom den allt större bristen på hålträd i vårt öppna landskap (bl.a. i hagmarker och alléer) kommer arten förmodligen att försvinna från en del av sina gamla lokaler om inte situationen förbättras.

Åtgärder

Allt bör göras för att behålla hålträd i det öppna landskapet. Eftersom det tar mycket lång tid att skapa sådana miljöer måste vi redan nu planlägga hur vi flera sekler senare skall kunna finna öppna marker med solbelysta hålträd.

Litteratur

- Horion, A. 1949. *Faunistik der Mitteleuropäischen Käfer Bd. 2*: 110. Frankfurt a. M.
Palm, T. 1954. Anteckningar om svenska skalbaggar IX. *Ent. Tidskr.* 75: 13.
Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubäume. *Opusc. Ent. Suppl. XVI*: 218. Lund.

Författare

Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.