



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Euplectus*, **Art:** *Euplectus bonvouloiri* Reitter, 1882 **Synonymer:**

Kännetecken

En rödbrun, långsträckt art som är 1,2 mm lång. Benen och antennerna är kraftigt byggda. Den yttersta antennleden är påfallande stor och bildar en klubba. Huvudet har en bågböjd grund fåra på ovansidan. Halsskölden har både en längs- och en tvärfåra. Täckvingarna, som endast täcker halva bakkroppen, har ett par fina längsfårar. *Euplectus*-arterna är svårbestämda och artbestämningen bör skötas av en specialist.

Utbredning och status

Endast påträffad i Skåne. Närmast i Danmark. Världsutbredningen är begränsad till Syd- och Mellaneuropa. Arten indelas i flera underarter. Den hos oss förekommande formen är *E. bonvouloiri* ssp. *rosae* Raffray, 1910.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. I Sverige funnen vid sällning av mulm i ihåliga men levande, mycket grova bokar, samt i fönsterfällor i anslutning till ihåliga ekar. Även utomlands är arten påträffad i anslutning till gamla lövträd.

Hot

Arten är bunden till lokaler med mycket gammal bokskog med talrika ihåliga träd, lågor och stubbar och är därigenom starkt hotad. Lokalen vid Maltesholm är inte fredad och planeras ej heller ingå i det reservat som kommer att omfatta andra delar av godset.

Åtgärder

Grova, rötskadade bokar bör alltid få stå kvar vid eventuella ingrepp. Det planerade naturreservatet vid Maltesholm bör utvidgas.

Litteratur

- Baranowski, R. 1976. Några för Sverige nya skalbaggar (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 97: 117–123.
Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. *Länsstyrelsen i Kristianstad*.

Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Stig Lundberg 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.