



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Gabrius*, **Art:** *Gabrius lividipes* (Baudi di Selve, 1848) **Synonymer:** *Philonthus lividipes* Baudi di Selve, 1848

Kännetecken

En 6–7 mm lång kortvinge med långsträckt spolförmig kropp. Kroppen är svart med gulröda täckvingar, ben och antennbas gula. Arten är mycket svår att skilja från flera närstående arter, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Utbredning och status

Påträffades först 1984 på Vinön i Närke (Vinön i Storhjälmaren). Återfunnen 2009 på flera lokaler på Vinön, och dessutom på en lokal vid Mjällån i Ångermanland. Närmast i södra Finland och i Baltikum (Litauen). Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Turkiet.

Ekologi

Ett rovdjur som lever bland uppspolad vass och annat driftmaterial på vegetationsfattiga, öppna sandstränder vid sjöar och vattendrag. I Mellaneuropa lever arten främst på stränder av rinnande vatten.

Hot

Artens status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskapsunderlag.

Åtgärder

Arten bör eftersökas.

Litteratur

Lundberg, S. 1986. Några förklaringar till 1986 års skalbaggs katalog, med under 1984 och 1985 nytillkomna arter. *Ent. Tidskr.* 107: 148–150.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.