



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Galeruca*, **Art:** *Galeruca laticollis* Sahlberg, 1838 **Synonymer:**

Kännetecken

En 6–9 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar gula eller gulbruna.

Utbredning och status

Ängsrutabaggen är känd från tre isolerade lokalområden i södra Sverige; dels i Skåne, dels på Öland och i östra Småland, dels i Uppland med utposter i Närke, Dalarna och Gästrikland. Efter 1985 finns fynd från Skåne, Öland och Uppland. Närmast finns arten i Danmark och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut till Mongoliet.

Ekologi

Lever på ängsruta (*Thalictrum flavum*). På fuktiga ängsmarker, strandängar eller i alkärr. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas från högsommaren fram till hösten. Arten saknar flygförmåga.

Hot

Fuktängar med ängsruta är starkt minskande på grund av igenväxning av höga gräs, buskar och träd i samband med nedlagd betesdrift under andra hälften av 1900-talet. Bestånd av ängsruta finns i nutiden ofta bara kvar som rester i alkärr och vasskanter.

Åtgärder

Vidmakthållet måttligt bete av fuktiga eutrofa stränder behövs för att gynna ängsrutabaggen och dess värdväxt.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.