



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta inquinula* (Gravenhorst, 1802) **Synonymer:**

## Kännetecken

En 1,1–1,2 mm lång kortvinge. Svart, täckvingar svartbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

## Utbredning och status

Tidigare påträffad i spridda landskap från Skåne till Dalarna. Det föreligger mycket få fynd av arten under senare tid, bl.a. från östra Skåne och Öland, men den kan till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Känd från alla våra grannländer utom Norge, samt från Baltikum. Världsubredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till Kazakstan. Arten har minskat starkt också i våra grannländer, och är rödlistad som Starkt hotad i Danmark, som Sårbar i Finland.

## Ekologi

Ett rovdjur som lever i spillning, as, ruttande svamp och multnande växtdelar. Främst funnen i halvtorr spillning av nöt eller häst på torra, varma lokaler såsom torrängar, betade sandhedar och alvarmarker. Fynd finns också från älgspillning på hällmark. Också larven är ett rovdjur knutet till spillning. Den fullbildade skalbaggen påträffas dels under våren-försommaren, dels under sensommaren-hösten.

## Hot

Artens tillbakagång står säkerligen i samband med den kraftiga minskningen av betet på magra, torra utmarker. Också användandet av avmaskningsmedel kan påverka arten.

## Åtgärder

Bibehåll beteshävd av sandmarker och torrängar, och undvik i möjligaste mån användandet av avermectiner i naturbetesmarker med artrik dynglevande fauna.

## Litteratur

Palm, T. 1970. Kortvingar, häfte 6. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

## Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.