


Oxycera meigenii

Snedfläckig strömvapenfluga



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)
B1ab(iii)+2ab(iii); D2

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Diptera (tvåvingar), **Familj:** Stratiomyidae (vapenflugor), **Släkte:** *Oxycera*, **Art:** *Oxycera meigenii* - snedfläckig strömvapenfluga Staeger, 1844 **Synonymer:** *Oxycera meigeni* Staeger, 1844

Kännetecken

Denna strömvapenfluga är en svart 6–8 mm lång fluga med gula teckningar. Huvudet har gula fläckar runt ögonen, ryggen har fläckar vid framhörnen, mitt på ryggen och vid bakhörnen. Den gula skutellen har två bakåtriktade tornar. Bakkroppen har gula sidomarkeringar som på lederna tre och fyra är klubbformade. Benen är gula utom lårens basala del som är mörka.

Utbredning och status

Det två kända fynden är från Skåne (1954, 2011). I övrigt är den känd från några lokaler på fyra danska öar samt förekommer spritt på kontinenten.

Ekologi

Larven lever på mossbeväxta stenar under ytan i klart, rinnande vatten, men förekommer även i dammar. I Åkarp är den fullbildade flugan insamlad i anslutning till ett dike och en parkdamm.

Hot

Arten hotas genom förorening och igenläggning av öppna diken och bäckar på slättlandet samt genom utfyllning av dammar och mangelgravar.

Åtgärder

Skydd för bäckar och dammar med god status.

Litteratur

- Andersson, H. 1962. Sällsynta eller för Sverige nya tvåvingar (Diptera). *Opusc. ent.* 27: 62–64.
Lyneborg; L. 1960. Tovinger II. *Danmarks fauna* 66: 119–120.
Rozkosny, R. 1973. The Stratiomyioidea (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. *Fauna Ent. Scand.* 1: 113.
Vaillant, F. 1951. Les larves d'Hermione. *Trav. Lob. Hydrobiol. Piscic.* Univ. Grenoble, 1951: 23–38.

Författare

Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelman 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.