

Phylan gibbus

Dubbelögd svartbagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Tenebrionidae (svartbaggar), **Släkte:** *Phylan*, **Art:** *Phylan gibbus* - dubbelögd svartbagge (Fabricius, 1775) **Synonymer:**

Kännetecken

En 7,5–8,5 mm lång skalbagge med klumpig, parallellsidig kropp, kraftiga ben och korta antenner. Kroppen är glänsande svart.

Utbredning och status

I Sverige endast känd genom några få fynd från Skåne (flera fynd längs Öresund från Hälsingborgstrakten till Kullen, men inga fynd efter 1920), Halland (Harplinge 1948) och Bohuslän (Rörö 2003). Därutöver är den funnen i Danmark och Norge samt i västra och södra Europa.

Ekologi

Lever på torra sand- och grusmarker nära havet, t.ex. i flygsanddyner. Såväl larven som den fullbildade skalbaggen gräver i marken. Larvutvecklingen sker under sommaren, och den fullbildade skalbaggen kan påträffas från maj (när parningen sker) till augusti (när den nya generationen kläcks). Den saknar flygförmåga.

Hot

Hot mot arten är igenväxning av kusthedar p.g.a. upphört bete, igenväxning av flygsanddyner p.g.a övergödning eller upphörd störning, samt överdrivet hårt slitage av det rörliga friluftslivet.

Åtgärder

Det är angeläget att lokaler där arten påträffas skyddas från exploatering, och att igenväxning förhindras genom lämplig skötsel (t.ex. bete).

Litteratur

- Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Ent Medd. XXXIII*: 320.
Koch, C. H. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas, Ökologi Bd 2*: 336. Krefeld.
Lindroth, C. H. 1933. Olikfotade skalbaggar, Heteromera. *Svensk Insektfauna Nr. 27*.

Författare

Stig Lundberg 1997. © ArtDatabanken, SLU 2006.