



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Planeustomus*, **Art:** *Planeustomus palpalis* (Erichson, 1839) **Synonymer:**

Kännetecken

En 2–2,5 mm lång kortvinge med smal kroppsbyggnad. Kroppen är rödgul eller brungul, huvudet och bakkroppen oftare mörkare, ben och antenner gula. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste granskas av en specialist.

Utbredning och status

Känd från Skåne, Blekinge, Öland och Gotland. Få lokaler är kända, och sentida fynd är endast kända från Öland och Gotland. Arten kan dock till viss del vara förbisedd p.g.a. sin ringa storlek och sitt undanskymda levnadssätt. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Lever underjordiskt på öppen, blöt mark, t.ex. diken, starrkärr eller försumpningar i betesmark. Lever likt arterna i släktet *Bledius* i grunda gångar i fuktig jord, där den antas livnära sig av alger eller multnande växtdelar. De långa, spetsiga käkarna antyder dock snarare ett levnadssätt som rovdjur. Livscykel och larvutveckling är dåligt kända. I Mellaneuropa har arten ofta påträffats tillsammans med släktingen *Manda mandibularis*, som har likartade habitatkrav. Den svärmar i skymningen, och har ofta påträffats vid kvällshävning.

Hot

Artens status och hotbilden är dåligt känd, men den förefaller ha minskat markant. Tänkbara hot är igenväxning av våtmarker p.g.a. upphörd eller otillräcklig beteshävd, utdikning samt igenfyllnad av småvatten.

Åtgärder

Upprätthåll beteshävd av kärr och stränder.

Litteratur

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. - *Ent. Tidskr.* 92:54-65.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.