

Plateumaris consimilis

Bred starrbock

Skalbaggar, Bladbaggar



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Plateumaris* (starrbockar), **Art:** *Plateumaris consimilis* - bred starrbock (Schrank, 1781) **Synonymer:**

Kännetecken

Längd 6–9 mm. Kropp bred och klumpig med kraftiga ben och antenner. Halssköld hjärtformad med tandformigt utstående framhorn. Kropp med brons-, koppar- eller grönaktig metallglans, ben och antenner rödbruna eller delvis mörka. Kroppen är bredare än hos övriga *Plateumaris*-arter, och halssköld och täckvingar har starkare rundade sidor.

Utbredning och status

Ej med säkerhet funnen i Sverige. I äldre litteratur uppges arten från flera landskap, men uppgifterna har visat sig vara antingen felbestämda eller feletiketterade. Närmast känd från Danmark och Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa till Sibirien och Japan.

Ekologi

Lever enligt utländska uppgifter på olika arter av starr (*Carex*) i vegetationsrika strandmiljöer och kärr. De fullbildade skalbaggar ses mest under försommaren då parningen sker. Fullbildade skalbaggar äter pollen, och kan påträffas i blommor av t.ex. kabbeleka (*Caltha palustris*). Honan lägger sina ägg på värdväxtens undervattensdelar. Larverna lever under vattnet på värdväxternas jordstammar, och larvutvecklingen är flerårig. Förpuppningen sker på eftersommaren i en kokong där den fullbildade skalbaggen övervintrar.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2005, 2012. Rev. Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.