



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)  
B2ab(iii)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Plectrophloeus*, **Art:** *Plectrophloeus nubigena* (Reitter, 1877) **Synonymer:**

## Kännetecken

En rödbrun långsmal art som är 1,5 mm lång. Benen är påfallande kraftigt byggda. Huvudet är ganska brett byggt och har en bågböjd fåra. På halsskölden finns både en tvär- och en längsfåra. Täckvingarna, som täcker halva bakkroppen, har vardera en kort och en lång längsfåra. *Plectrophloeus*-arterna är så lika varandra att specialishjälp krävs för säker artbestämning.

## Utbredning och status

Känd från Skåne, Blekinge, Halland och Öland. Närmast i Danmark. Världsutbredningen sträcker sig från Syd- och Mellaneuropa till Turkiet och Iran.

## Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas i lös ved eller mulm i stubbar, lågor och ihåliga grova, murkna ädellövträd, främst bok men även ek.

## Hot

Passande bestånd för arten, i synnerhet gamla orörda bokskogar, är numera mycket ovanliga.

## Åtgärder

Alla återstående gamla bokbestånd bör fredas. Döda stubbar, lågor och ihåliga träd bör ej städas bort. För *Plectrophloeus nubigena* är det av särskild vikt att förekomstplatserna vid Maltesholm och Degeberga i Skåne snarast skyddas.

## Litteratur

- Baranowski, R. 1980. Intressanta skalbaggsfynd 5. *Ent. Tidskr.* 101: 99–106.  
Baranowski, R. 1982. Intressanta skalbaggsfynd 6. *Ent. Tidskr.* 103: 130–136.  
Baranowski, R. 1991. En inventering av skalbaggsfaunan vid Maltesholm. *Länsstyrelsen i Kristianstad*.  
Gillerfors, G. 1982. Anteckningar om svenska coleoptera 2. *Ent. Tidskr.* 103: 73–77.  
Lundberg, S. 1966. Bidrag till kännedom om svenska skalbaggar 9. *Ent. Tidskr.* 87: 50–55.  
Palm, T. 1959. Die Holz- und Rinden-Käfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. suppl.* XVI.

## Författare

Rickard Baranowski 1994. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.