



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Sårbar (VU)
B1ab(iii,iv)+2ab(iii,iv)

Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Ptinidae (trägnagare), **Släkte:** *Priobium*, **Art:** *Priobium carpini* (Herbst, 1793) **Synonymer:**

Kännetecken

En 5 mm lång mörkbrun, tätt behårad, cylindriskt och långsmalt byggd skalbagge. Halsskölden är högt välvd och skyler en stor del av huvudet. Täckvingarna är försedda med tydliga punktrader. Benen och antennerna är kraftigt byggda.

Utbredning och status

Endast känd från Skåne. Arten är även påträffad i Danmark och Finland samt i Karelen, Lettland och Litauen. Den finns dessutom i Mellan- och Sydeuropa samt österut i Ryssland.

Ekologi

Larvutvecklingen sker vanligen i torr, död barrträdsved. De svenska fynden är främst gjorda i byggnadsvirke i gamla hus. Arten är dock även påträffad utomhus, främst i lövträdsved, huvudsakligen av björk men även poppel, avenbok och körsbärsträ. Larvutvecklingen sträcker sig förmodligen över två år. En del fullvuxna larver förpuppar sig troligen redan på hösten, varvid den fullbildade skalbaggen övervintrar i veden. Den kan sedan påträffas framme på det angripna virket från maj till augusti.

Hot

Bristen på gammal död ved, i form av såväl grövre byggnadsvirke som död, torr ved ute i naturen.

Åtgärder

Spar mer död ved, både av löv- och barrträd ute i naturen. Bevara gamla träbyggnader, även inne i städer.

Litteratur

- Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1969. *Die Käfer Mitteleuropas*. Vol. 8: 48.
Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Entom. Meddel.* 33: 299.
Palm, T. 1959. Die Holz- und Rindenkäfer der süd- und mittelschwedischen Laubbäume. *Opusc. Ent. Suppl. XVI*: 277.
Palmén, E. 1946. Materialien zur Kenntnis der Käferfauna in westlichen Swirgebiet. *Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn.* 65(3): 65–66.
Saalas, U. 1923. Die Fichtenkäfer Finnlands II. *Ann. Acad. Scient. Fenn. Ser. A. Tom. 22. Nr. 1*: 224.

Författare

Bengt Ehnström 1999. © ArtDatabanken, SLU 2006.