

# *Prionychus melanarius*

## Becksvart kamklobagge

Skalbaggar, Tenebrionoidea (olikfotade baggar m.fl.)



NE NA LC DD NT **VU** EN CR RE

Sårbar (VU)  
B2ab(i,iii,iv)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Tenebrionidae (svartbaggar),  
**Släkte:** *Prionychus*, **Art:** *Prionychus melanarius* - becksvart kamklobagge (Germar, 1813) **Synonymer:**

### Kännetecken

En bred, klumpigt byggd art som är 10–12 mm lång. Den är svart och ganska starkt glänsande. Fotlederna är rödbruna. Benen och antennerna är långa och benen är kraftigt byggda. Huvudet är litet i förhållande till resten av kroppen. Täckvingarna har längsrader med punkter.

### Utbredning och status

Utbredd i östra Sverige från Skåne till Uppland, och längs Västkusten. Närmast i Norge, Finland och Karelen. Världsbredningen är begränsad till Europa.

### Ekologi

Larvutvecklingen sker i död ved, främst av lövträd som ek, bok, björk och alm, troligen också ask och lind, men även av tall. Främst i brunrötad ved och mulm i hålträd, bland annat funnen i gnagmjölet från läderbaggen (*Osmoderma eremita*), även i lågor. Dessutom är arten funnen i trädavfall vid sågverk. Den fullbildade skalbaggen är nattaktiv, och påträffas under juni-juli.

### Hot

Avverkning av ihåliga träd i hagmarker, alléer och parker.

### Litteratur

- Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 11–28.  
Lundberg, S. 1993. Sällsynta och hotade skalbaggar i Hornsö- och Strömsrumstrakten i östra Småland. *Ent. Tidskr.* 114: 83–96.  
Palm, T. 1946. Anteckningar om svenska skalbaggar. II. *Ent. Tidskr.* 67: 11–20.  
Ringdahl, A. 1939. Coleoptera och Macrolepidoptera från Hallands Väderö. *Opusc. Ent.* 4: 170–184.

### Författare

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000, Håkan Ljungberg 2015. © ArtDatabanken, SLU 2015.