



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Dasytidae (borstbaggar), **Släkte:** *Psilothrix*, **Art:** *Psilothrix viridicoerulea* (Geoffroy, 1785) **Synonymer:** *Psilothrix viridicoeruleus* (Geoffroy, 1785)

## Kännetecken

---

En 6 mm lång, långsträckt skalbagge. Kroppen är blågrönt metallglänsande. Benen är långa och kroppens översida är täckt med en tydlig behåring. Speciellt halsskölden är påfallande grovt punkterad.

## Utbredning och status

---

Endast känd i ett svenskt exemplar, påträffat på Öland 1955. Det kan inte uteslutas att fyndet är av tillfällig karaktär. Närmast i Danmark och Lettland. Världsutbredningen sträcker sig från Väst- och Sydeuropa söderut till Nordafrika och österut till Turkiet.

## Ekologi

---

Biologin är dåligt känd. De fullbildade skalbaggarna påträffas främst i blommor, t.ex. fibblor, på torra, öppna marker.

## Hot

---

Igenväxning av artens lokaler, bland annat till följd av upphörande bete.

## Åtgärder

---

Vidmakthållen hävd av värmegynnade öppenmarker.

## Litteratur

---

Lundberg, S. 1983. Skalbaggar på Ölands Stora alvar. *Ent. Tidskr.* 104: 121–126.

## Författare

---

Stig Lundberg 1997. Rev. Bengt Ehnström 2000. © ArtDatabanken, SLU 2006.