



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Psylliodes*, **Art:** *Psylliodes cuprea* (Koch, 1803) **Synonymer:** *Psylliodes cupreus* (Koch, 1803)

Kännetecken

En 2,5–3,2 mm lång jordloppa med äggrund kropp och kraftiga hoppben. Kroppen är svart med bronsfärgad eller grönaktig metallglans, ben och antenner brunaktiga. Arten är mycket svår att identifiera, och bestämningen måste därför granskas av en specialist.

Utbredning och status

Arten är sällsynt påträffad i Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Öland och Gotland. Efter 1985 finns enstaka fynd från Halland, Öland och Gotland. Närmast är arten funnen i Danmark där den anses akut hotad, och i Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa och Nordafrika till Mongoliet.

Ekologi

Lever på vägsenap, *Sisymbrium officinale*, på torra och öppna störda marker såsom väg- och åkerslänter. Larven utvecklas under sommaren. Fullbildade individer uppträder dels i juli-augusti, dels efter övervintring i maj, då fortplantning och äggläggning äger rum.

Hot

Artens tillbakagång hänger säkerligen samman med minskningen i värdväxtens förekomst. Vägsenap hör till en grupp av "gammaldags" gårds- och gatuväxter som gått särskilt starkt tillbaka under de senaste 50 åren.

Åtgärder

Behåll trädor, obesprutade kantzoner och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet. Arten bör dessutom eftersökas systematiskt.

Litteratur

Ljungberg, H. 2002. Bete, störning och biologisk mångfald i odlingslandskapet – hotade skalbaggar i öländska torrmarker. *Länsstyrelsen i Kalmar län, Miljöenheten, meddelande 2002:20*.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. Rev. Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.