

# Merrifieldia baliodactyla

## Kungsmyntefjädermott

Fjärilar, Mott



NE

NA

LC

DD

NT

VU

EN

CR

RE

Nära hotad (NT)  
B2ab(ii,iii,iv)

**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Lepidoptera (fjärilar), **Familj:** Pterophoridae (fjädermott), **Släkte:** *Merrifieldia*, **Art:** *Merrifieldia baliodactyla* - kungsmyntefjädermott Zeller, 1841 **Synonymer:** *Merrifieldia baliodactylus* Zeller, 1841, *Pterophorus baliodactylus* Zeller, 1841

### Utbredning och status

Arten förekommer lokalt i flertalet landskap från Skåne till Gästrikland, ibland i antal. Den är även känd från de nordiska grannländerna och förekommer dessutom söderut i nästan hela Europa.

### Ekologi

Larven lever uteslutande på toppar av kungsmynta (*Origanum vulgare*) fram till förpuppningen i juni. Fjärilen flyger huvudsakligen i juli i lövskogsbryn och bergsbranter.

### Hot

Igenväxning och skogsplantering efter upphört bete. Gräsinsåning i vägslänter.

### Åtgärder

Vidmakthåll hävden av öppnenmarker. Avstå från att beså vägsränningar med gräs.

### Litteratur

Arenberger, E. 1995. Pterophoridae. *Microlepidoptera Palearctica* 9 (2 band).

Deurs, W. van. 1948. Fjermøl. *Danmarks Fauna Bd. 52*.

Hannemann, H.-J. 1977. Federmotten, Gespistmotten, Echte Motten. *Die Tierwelt Deutschlands*, 63. Teil.

### Författare

Ingvar Svensson 1997.