



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta clientula* (Erichson, 1839) **Synonymer:** *Acrotona clientula* (Erichson, 1839)

Kännetecken

En 2,3–3,2 mm lång kortvinge med spolformig kropp. Brunsvart, huvud svart, täckvingar och ben gulbruna. Arten är mycket svårbestämd, och bestämningen måste kontrolleras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från spridda landskap från Skåne till Hälsingland. Efter 1980 finns fynd endast från Skåne, Öland och Gotland. Närmast känd från Danmark, Norge och Finland. Världsutbredningen sträcker sig från Västeuropa och Nordafrika till östra Sibirien.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten påträffas främst i halmkomposter, i stall och lador. Dessutom är arten funnen i lövförna i en ihålig ek. Larvutvecklingen sker under sommaren, och flertalet fynd är gjorda under vinterhalvåret.

Hot

I inomhusmiljöer hotas arten av förbättrad hygien och ändrade byggnadsformer (betonggolv i stället för jordgolv i stallar o. likn.).

Åtgärder

Om möjligt bör man undvika att sanera det fåtal inomhuslokaler där arten ännu påträffas.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.