



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Atheta*, **Art:** *Atheta pandionis* Scheerpeltz, 1958 **Synonymer:**

Kännetecken

En ca 3 mm lång kortvinge. Svart eller svartbrun, täckvingar röd- eller gulbruna, ben gulbruna. Arten är svårbestämd, och bestämningen måste verifieras av en specialist.

Utbredning och status

Känd från Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Åsele, Lycksele, Pite och Lule lappmark. Närmast i Norge och Finland samt i Estland. Världsutbredningen omfattar förutom Norden och Baltikum endast den europeiska delen av Ryssland.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Arten är funnen i bo av fiskgjuse, ormvråk och havsörn, men också i anslutning till gamla tallar med angrepp av reliktböck (*Nothorhina muricata*). Flera fynd är gjorda vid fällfångster i urskogsreservat.

Hot

Hotsituationen är svårbedömd. De få fynden tyder dock på att arten ställer höga krav på substrat och livsmiljö.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Palm, T. 1970. Kortvingar, häfte 6. *Svensk Insektfauna* 9. Stockholm.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.