



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Dasytidae (borstbaggar), **Släkte:** *Aplocnemus*, **Art:** *Aplocnemus impressus* (Marsham, 1802) **Synonymer:** *Aplocnemus pini* (Redtenbacher, 1849), *Haplocnemus pini* (Redtenbacher, 1849)

Kännetecken

En långsmal, cylindriskt byggd art som blir 4–5mm lång. Arten är brunsvart med en tydlig bronsglans på översidan. Antennerna är svagt kammade och klorna på fötterna är påfallande stora och försedda med en egendomlig flik. Täckvingarnas ytterkanter är försedda med små tänder som blir mycket tydliga längst bak. Antenner och ben är gulbruna.

Utbredning och status

Utbredd från Skåne till Uppland. Känd från alla de nordiska länderna och Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Andra arter i detta släkte lever i förna där larverna anges leva som rovdjur på andra ryggradslösa djur. Arten tycks förekomma främst i gamla barrskogar med en tjock förnabildning innehållande kottar och grenar. Den är även påträffad i gamla ekbestånd. De fullbildade larverna går på hösten in i kottar eller grenbitar som ligger nedbäddade i förnan och förpuppar sig där. Den nykläckta, fullbildade skalbaggen övervintrar i förnan och visar sig framme, främst i juni. Den sitter ofta i blommorna av barrträd eller på grenar av träd.

Litteratur

- Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. *Die Käfer Mitteleuropas*. Bd. 6: 72.
Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller. *Entom. Meddel.* 33: 209.
Koch, K. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas*, Ökologie Bd. 2: 52.

Författare

Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.