



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Bibloporus*, **Art:** *Bibloporus mayeti* Guillebeau, 1892 **Synonymer:**

Kännetecken

En liten, cirka 1,3 mm, lång blankt svartbrun skalbagge. Täckvingarna är korta och täcker enbart hälften av bakkroppen. Antenner och ben är kraftigt byggade. Antennernas yttre leder är betydligt bredare än de andra lederna. På både täckvingar och halssköld finns längsfårar. På huvudet finns en tydlig bågböjd fåra. Hos hanarna är de mellersta skenbenen utvidgade.

Utbredning och status

Påträffad på ett par lokaler i Blekinge samt en lokal i östra Småland. Den är ej påträffad i övriga nordiska länder. Världsutbredningen är begränsad till Europa.

Ekologi

Lever under bark på nyligen döda träd, ibland även i murken ved, bl.a. i hålträd. De svenska fynden är gjorda under barken på ganska nyligen döda ekar och bokar, främst på grövre grenar. Arten är i Mellaneuropa även påträffad på *Salix*- och *Populus*-arter. Påträffas främst i kambiezonan eller i innerbarken, där den lever som rovdjur på kvalster o. dyl. De fullbildade insekterna påträffas mest under hösten och fram till nästa försommar.

Hot

Bristen på nyligen döda lövträd främst ek och bok på de mycket begränsade ställen som arten är påträffad i. Insamling av djur och söndersällning av lämpliga substrat kan även innebära ett hot mot arten.

Åtgärder

Man bör se till att ej successionerna av blivande substrat ej upphör inom dessa begränsade lokaler. Man bör även inskränka tillstånden att samla in arten på de två lokaler som det rör sig om.

Litteratur

Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1974. *Die Käfer Mitteleuropas* Bd. 5: 312.
Koch, K. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas*. Ökologie, Bd. 2: 11.

Författare

Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.