



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** *Malachiidae*, **Släkte:** *Ebaeus*, **Art:** *Ebaeus lapplandicus* Evers, 1993 **Synonymer:**

Kännetecken

En svart cirka 3 mm lång skalbagge med långa ben och antenner. Den bakre delen av täckvingarna är rödgul liksom fram- och mellanbenen. Täckvingarna är tydligt utvidgade baktill. Hanarna har på bakkroppen gulröda slangar som ibland kan skjutas ut cirka 1 mm om djuret störs.

Utbredning och status

Känd från spridda landskap från Småland till Lycksele lappmark. Den kända världsutbredningen är begränsad till Sverige, Norge och Lettland.

Ekologi

Larvutvecklingen sker i gångar av trägnagare (t.ex. *Anobium rufipes*) i död ved av barrträd, där larven troligen lever som rovdjur. De fullbildade skalbaggar påträffas i juni och juli i blommor där de lever av pollen.

Litteratur

- Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. 1979. *Die Käfer Mitteleuropas*, Bd. 6: 67.
Hansen, V. 1964. Fortegnelser over Danmarks biller. *Entom. Meddel.* 33: 206.
Koch, K. 1989. *Die Käfer Mitteleuropas*, Ökologie Bd. 2: 48.

Författare

Bengt Ehnström 2001. © ArtDatabanken, SLU 2006.