



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Euplectus*, **Art:** *Euplectus duponti* Aubé, 1833 **Synonymer:**

Kännetecken

En 1,6–1,8 mm lång, rödbrun kortvinge med parallellsidig kropp och kraftiga ben. Arten är svårbestämd, och artbestämningen måste granskas av en specialist.

Utbredning och status

Endast känd från västra Skåne. Det första svenska fyndet gjordes 1976. Närmast känd från Danmark och Baltikum (Lettland). Världsutbredningen är begränsad till Västeuropa, och sträcker sig mot sydost till Österrike.

Ekologi

Biologin är dåligt känd. Svenska fynd är gjorda vid sällning av lövförna i anslutning till grova almar, och i ruttnande potatis som grävts ned i marken som lockbete. I Danmark finns flera fynd i poppelstubbar, men arten är också funnen i grustag. Också i Mellaneuropa uppges den leva i förna, främst i anslutning till träd. Larvutvecklingen sker förmodligen under sommaren, och den fullbildade skalbaggen påträffas under våren-försommaren och under hösten.

Hot

Status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap.

Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

Litteratur

Baranowski, R. 1977. Intressanta skalbaggsfynd 1 (Coleoptera). *Ent. Tidskr.* 98: 11–28.
Baranowski, R. 1979. Intressanta skalbaggsfynd 4. *Ent. Tidskr.* 100: 71–79.

Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.