



**Klass:** Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Staphylinidae (kortvingar), **Släkte:** *Gabrius*, **Art:** *Gabrius bescidicus* Smetana, 1954 **Synonymer:**

## Kännetecken

En 4,5–5 mm lång kortvinge med slank, spolförmig kropp. Svartbrun med ljusare ben. Arten är mycket svårskild från närstående arter, och bestämningen måste granskas av en specialist.

## Utbredning och status

Känd från några glest spridda lokaler i Norrbotten, Åsele och Pite lappmark. Närmast i Finland. Utanför Norden är arten endast känd från Tjeckien.

## Ekologi

Biologin är dåligt känd. Artens närmaste släktingar lever under barken på döda träd. Svenska fynd är gjorda vid sällning av mossa, i anslutning till granris i en myrkant och i en fönsterfälla i urskogsartad tallskog.

## Hot

Artens status och hotsituation är svårbedömda utifrån nuvarande kunskap.

## Åtgärder

Arten bör eftersökas, och dess status samt exakta krav klarläggas.

## Litteratur

Lundberg, S. 1966. Något om skalbaggsfaunan inom Reivo-reservatet. *Opusc. Ent.* 31: 33–38.

## Författare

Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.