



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Coleoptera (skalbaggar), **Familj:** Chrysomelidae (bladbaggar),
Släkte: *Galeruca*, **Art:** *Galeruca pomonae* (Scopoli, 1763) **Synonymer:**

Kännetecken

En 6–12 mm lång bladbagge med bred, tillplattad kropp och bakåt utvidgade täckvingar. Svart, halssköld och täckvingar oftast gulbruna eller bruna, sällan svarta.

Utbredning och status

Utbredd med vissa luckor från Skåne till Dalarna och vidare längs Norrlandskusten till Västerbotten. Arten har minskat starkt under 1900-talets andra hälft. Fynd efter 1985 finns från södra Götaland från Halland till Gotland, från Värmland samt från Hälsingland. Närmast finns arten i Danmark där den anses sällsynt men inte hotad och Baltikum. Arten är utbredd från Europa och Nordafrika österut till Kina.

Ekologi

Lever på korgblommiga växter, främst rödklint (*Centaurea jacea*). Ofta på torra sandiga marker som åsslänter, sandtakter och älvbrinkar, men också på alvarmarker. Arten saknar flygförmåga.

Hot

Torra, solexponerade sandmarker hotas av igenväxning som en följd av bl.a upphörd hävd, skogsplantering eller vattenreglering. Spridningsförmågan är begränsad, vilket kan göra att lokala förekomster blir isolerade.

Åtgärder

Örtrika sandmarker bör särskilt gynnas vid naturvårdsåtgärder.

Författare

Hans-Erik Wanntorp 2012. © ArtDatabanken, SLU 2012.