

Rubus dissimulans

Bohusbjörnbär



Klass: Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), **Ordning:** Rosales (rosordningen), **Familj:** Rosaceae (rosväxter), **Släkte:** *Rubus* (rubusar), **Art:** *Rubus dissimulans* - bohusbjörnbär Lindeb. **Synonymer:** *Rubus bahusiensis* (Scheutz) Boulay, *Rubus corylifolius ssp. bahusiensis* Scheutz, *Rubus selectus* (Frid. & Gelert) E. H. L. Krause, *Rubus milliformis var. selectus* Frid. & Gelert, *Rubus nitens* (Lindeb.) Neuman

Kännetecken

Bohusbjörnbär är ett upprättväxande krypbjörnbär, vilket är ovanligt. I synnerhet blomställningen, men även årsskottet, är tätt besatt med glandelhår. Blomställningen är rikligt taggig, och det finns ej sällan även taggar ända upp på foderbladens yta. Krypbjörnbär (sect. *Corylifolii*) skiljer sig från äkta björnbär (sect. *Rubus*) bland annat genom kortare skaft på småbladen, de nedre 0–2 mm mot 2–6 mm, de övre sidobladen 3–10 mm (mot 12–25 mm); småbladen överlappar oftast (mot sällan överlappande); frukt matt (mot frukt blank); stipler lansettlika (mot stipler lineära).

Utbredning och status

Bohusbjörnbär förekommer i Sverige utmed Västkusten. Aktuella lokaler finns i nordvästra Skåne (några närbelägna lokaler på Kullaberg), Västergötland (Styrsö, 1 lokal) och i norra Bohuslän (8 lokaler). Antalet lokaler är litet och de förefaller vara inskränkta till de mest klimatgynnade delarna av kusten. Flera tidigare lokaler har förstörts genom exploatering, och antalet nutida kända förekomster är mycket lågt. Artens övriga utbredning omfattar sydöstra Norge, Danmark och norra Tyskland.

Ekologi

Liksom flertalet andra björnbärsarter växer bohusbjörnbär i ljusöppna bryn, vägkanter och dylikt. Arten förefaller vara mera värmekrävande än många andra krypbjörnbärsarter.

Hot

Exploatering, igenväxning samt vägkantsrensning är viktiga hot mot bohusbjörnbär.

Åtgärder

Det är viktigt att hävden bibehålls på de hävdade lokalerna med bohusbjörnbär. Arten bör övervakas av floraväktare och hotbilden bör klarläggas ytterligare.

Litteratur

- Bertilsson, A. m fl 2002. *Västergötlands flora*. Lund.
- Blomgren, E. 2005. *Floraväktarverksamheten i Bohuslän. Årsrapport 2004*. Föreningen Bohusläns flora.
- Georgson, K. m. fl. 1997. *Hallands flora*. Lund.
- Gustafsson, C. E. 1938. Skandinavians *Rubusflora*. *Bot. Not.* 91: 378–420.
- Hellman, L. & Herloff, B. 2005. Styrös socken efter västgötainventeringen. *Calluna* 22 (1): 16–25.
- Kurto, A., Weber, H. E., Lampinen, R. & Sennikov, A. N. (eds.) 2010: Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. *Rosaceae (Rubus)*. - The Committee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki. 362 pp.
- Olsson, K.-A. 2000. Gamla bekanta – nya vänner. Rödlistade arter i Sverige 2000 ur ett skånskt perspektiv. *Lunds Botaniska Förening. Medlemsblad* 2000 (3): 4–23.
- Pedersen, A. & Schou, J. C. 1989. Nordiske Brombær (*Rubus* sect. *Rubus*, sect. *Corylifolii* og sect. *Caesii*). *AAU Reports* 21.
- Sahlin, E. 2005. Floraväktarverksamheten i Västergötland. Årsrapport 2004. *Calluna* 22 (2): 1–49.

Författare

Erik Ljungstrand 2001. © ArtDatabanken, SLU 2007.