

Clubiona subtilis

Dvärgsäckspindel

Spindeldjur, Spindlar



Klass: Arachnida (spindeldjur), **Ordning:** Araneae (spindlar), **Familj:** Clubionidae (säckspindlar), **Släkte:** Clubiona, **Art:** Clubiona subtilis - dvärgsäckspindel L.Koch, 1867 **Synonymer:**

Kännetecken

Vår allra minsta art av familjen Clubionidae, säckspindlar. Kroppslängden är 2,5-4,5 mm. Framkroppen är rödbrun med mörkare anstrykning kring ögonen. Bakkroppen är gul-eller rödaktig, framtill med ett mörkare längsgående band. För säker bestämning bör kopulationsorganens byggnad studeras, se Tullgren (1946), Roberts (1995) och Almquist (2006).

Utbredning och status

Arten förekommer i större delen av Europa. I Sverige är arten funnen på ett fåtal lokaler längs östra kusten från Skåne till Norrbotten

Ekologi

Arten förekommer i öppna våtmarker, tex kärr, mossar, strandängar, men är även funnen i kustnära sanddyner. Artens biologi är dåligt känd. Vuxna individer har påträffats från från tidig vår till höst.

Hot

Artens habitat växer gradvis igen och minskar sannolikt.

Åtgärder

Artens bör eftersökas och aktuell utbredning och status fastställas.

Litteratur

- Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part. 2. - *Insect Systematics & Evolution Suppl.* 63: 285-603.
Roberts, M. J. 1995. *Spiders of Britain & Northern Europe*. Collins, London.
Tullgren, A. 1946. Clubionidae, Zoridae och Gnaphosidae. *Svensk Spindelfauna* 3. *Egentliga spindlar, Araneae. Fam. 5-7*. Entomologiska föreningen, Stockholm.

Författare

Jonas Sandström 2010.