

Salticus scenicus

Sebraspindel

Spindeldjur, Spindlar



Klass: Arachnida (spindeldjur), **Ordning:** Araneae (spindlar), **Familj:** Salticidae (hoppspindlar), **Släkte:** *Salticus*, **Art:** *Salticus scenicus* - sebraspindel (Clerck, 1757) **Synonymer:** *Araneus scenicus* Clerck, 1757, *Aranea scenica* Linnaeus, 1758

Kännetecken

Medelstor hoppspindel med slank kropp och med kontrastrik zebrateckning. Könen har likartad teckning med stor variation. Arterna inom släktet *Salticus* har variabel teckning och för säker bestämning bör genitalier studeras. Hane: Längd 4,0-7,0 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Käkar långa och framåtriktade. Bakkropp variabel teckning. Kontrastrikt svart-vitt tecknad med få spridda vita hår i de svarta fälten. Framkant med obruten vit linje följt av två par tvärinjer som smalnar mot mitten och kan eventuellt möts där. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydning till ringlat mönster. Övriga benpar mönster likt ben I. Palper mörka med ljusa hår framtill. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med vita hår främst mellan ögonen och undertill mot läppen. Könsorgan: Den synliga spetsen av embolus (e) kort. Utskott på palpens skenben spetsig. Hona: Längd 5,5-7,5 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Bakkropp variabel teckning. Ofta kontrastrikt svart-vitt tecknad. Framkant med obruten vit linje följt av två svagt vinkelställda vita tvärinjer som nästan möts i mitten. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Sällan med en ljusare mittlinje. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydning till ringlat mönster. Övriga benpar med mönster likt ben I. Palper ofta bleka med vit borstig behåring. Läpp med tydligt vitt band av täta vita hår. Främre ögonparets kant med vit behåring som flyter samman med läppens hår. Könsorgan: Epigynets bredare än långt. Den nedre delen täckt av kitiniserade plattor.

Utbredning och status

Förekomst i Sverige: Götaland, Svealand och Norrland.
Förekomst globalt: Europa österut till Asien och Nordamerika.

Ekologi

Förekommer i solbelysta lägen nära byggnader, men även berghällar och stenvägar. Uppehåller sig på husväggar, murar, klippor och sten. Adulter funna vår till höst.

Litteratur

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2--families Dictynidae to Salticidae. *Insect Systematics & Evolution*, Supplement 63: 285-601.
Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. *Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch*. Verlag Paul Parey, Berlin.
Roberts, M. J. 1995. *Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe*. HarperCollins, London.
Tullgren, A. 1944. *Svensk Spindelfauna*. 3. Araneae (Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae). Stockholm, pp. 1-108.

Författare

Jonas Sandström 2016