



Klass: Insecta (egentliga insekter), **Ordning:** Hemiptera (halvvingar), **Familj:** Miridae (ängsskinnbaggar), **Släkte:** *Deraeocoris*, **Art:** *Deraeocoris punctulatus* (Fallén, 1807) **Synonymer:**

Kännetecken

D. punctulatus är en rundad och ovalt formad ängsskinnbagge. Huvud och mellankropp är glänsande mörka med ljusare teckning, i form av tydlig/otydlig mittlinje. Skutellen är mörk med ljusare teckning. Täckvingarna är gulbruna med mörkare teckning. Mellankropp och täckvingar glänsande och punkterade. Membranen i ändan av täckvingen gråbruna. Kroppslängd 3,7–4,5 mm.

Utbredning och status

I Sverige är *D. punctulatus* funnen på flertal lokaler i Skåne, Blekinge, Öland, och Gotland. Arten är eventuellt försvunnen från Sverige då den ej observerad sedan 1945, trots flera fynd före 1930-talet. Arten är eventuellt även försvunnen från Danmark. I Europa förekommer arten i Mellan- och Östeuropa och har en vidare holarktisk utbredning i Sibirien, Kina, Korea, Alaska och västra Kanada. Upptagen som missgynnad (NT) på den finska rödlistan.

Ekologi

Släktet *Deraeocoris* skiljer sig från andra ängsskinnbaggar genom att vara rovlevande, den här arten tros leva framförallt på bladlöss, stritar och små larver. Arten lever på marken och i örtskiktet på torra och sandiga lokaler i sydvänt läge och tycks inte vara bunden till någon särskild växt. Övervintrar som vuxen, och den nya generationen ses från mitten av juli - hösten.

Hot

Om arten finns kvar i Sverige är antalet lokaler troligtvis få. Effekter av liten population och fragmentering är då ett hot.

Åtgärder

Om arten återfinns bör lokalen skyddas och skötas på lämpligt sätt.

Litteratur

Gaun, S. 1974. *Blomsteræger*. Danmarks Fauna 81. Dansk Naturhistorisk Forening. Köpenhamn.
Skipper, L.: Danmarks blomstertæger. 2013. Apollo booksellers. 1-407.
Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. *Wanzen 2*. Die Tierwelt Deutschland 75: 1–294.

Författare

Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.